

Premedikace k CT vyšetření s použitím kontrastní látky při pozitivní alergické anamnéze

Jméno, příjmení:

Vyšetření se provádí nalačno (6 hodin před vyšetřením nejíst). Den před plánovaným vyšetřením a stejně tak další den po vyšetření zvýšit příjem tekutin. Poslední 4 hodiny před vyšetřením tekutiny omezit (na 100 ml/hod.) Močení je doporučeno naposledy 1 hodinu před vyšetřením.

Pacient s jakoukoliv alergií užije:

- **Den před vyšetřením ve 20 hod. 40 mg. tbl. kortikoidu s účinnou látkou prednisonum**
- **V den vyšetření v 6 hod ráno 20 mg. tbl. kortikoidu s účinnou látkou prednisonum**

Uvedené látky podá odesílající ambulance.

U akutních stavů bude premedikace na CT pracovišti.

- U diabetiků II. typu, užívajících antidiabetika (s účinnou látkou metformin): je třeba tyto na 2 dny vysadit!
- U pacientů s projevy renální insuficience je třeba uvést aktuální hodnoty (týden) urea, kreatinin
- Pacienti k vyšetření v oblasti břicha a malé pánve budou před CT vyšetření v rámci přípravy pít v čekárně CT pracoviště po dobu 1-2 hodiny vodu či zředěnou kontrastní látku.
- Při nejasnostech ohledně uvedených přípravků, se obraťte na Vašeho lékaře

Odesílající ambulance:

podpis, razítko: